2020 胰定達標控糖強化競賽
決選評選標準修正對照表

修正後

(註一)HbA1C 平均值的計分方式：30 分

所有病患最後一次觀察點的 HbA1C 平均值(%)	獲得積分
HbA1C≤7.0	30
7.0<HbA1C≤7.5	25
7.5<HbA1C≤8.0	20
8.0<HbA1C≤8.5	15
8.5<HbA1C	10

(註二)轉換前後 HbA1C 改善幅度平均值：20 分

所有病患轉換前後 HbA1C 改善幅度平均值(%)	獲得積分
HbA1C 改善幅度平均值≥1.5%	20
1%≤HbA1C 改善幅度平均值<1.5%	15
0.5%≤HbA1C 改善幅度平均值<1.0%	10
HbA1C 改善幅度平均值<0.5%	5

修正前

(註一)HbA1C 平均值的計分方式：30 分

所有病患最後一是觀察點的 HbA1C 平均值(%)	獲得積分
HbA1C≤7.0	30
7.0≤HbA1C≤7.5	25
7.5≤HbA1C≤8.0	20
8.0≤HbA1C≤8.5	15
HbA1C≥8.5	10

(註二)轉換前後 HbA1C 改善幅度平均值：20 分

所有病患最後一是觀察點的 HbA1C 平均值(%)	獲得積分
HbA1C 改善幅度平均值≥1.5%	20
1%≤HbA1C 改善幅度平均值≤1.5%	15
0.5%≤HbA1C 改善幅度平均值≤1.0%	10
HbA1C 改善幅度平均值≤0.5%	5

2020 胰定達標控糖強化競賽
決選評選標準 修正對照表

<table>
<tr><th>修正後</th><th>修正前</th></tr>
<tr><td>(註三)所有病患 HbA1C 達標率的計分方式:30 分
<table>
<tr><th>HbA1C 達標率(%)</th><th>獲得積分</th></tr>
<tr><td>50%≤達標率</td><td>30</td></tr>
<tr><td>40%≤達標率<50%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>30%≤達標率<40%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>20%≤達標率<30%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>達標率<20%</td><td>10</td></tr>
</table></td><td>(註三)所有病患 HbA1C 達標率的計分方式:30 分
<table>
<tr><th>HbA1C 達標率(%)</th><th>獲得積分</th></tr>
<tr><td>達標率≥50%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>40%≤達標率≤50%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>30%≤達標率≤40%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>20%≤達標率≤30%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>達標率≤20%</td><td>10</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(註四)體重變化的計分方式:20 分
<table>
<tr><th>平均體重變化(Kg)</th><th>獲得積分</th></tr>
<tr><td>平均體重變化≤-2Kg</td><td>20</td></tr>
<tr><td>-2Kg<平均體重變化≤0Kg</td><td>15</td></tr>
<tr><td>0Kg<平均體重變化≤1Kg</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1Kg<平均體重變化</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>(註四)體重變化的計分方式:20 分
<table>
<tr><th>HbA1C 達標率(%)</th><th>獲得積分</th></tr>
<tr><td>平均體重變化≥-2Kg</td><td>20</td></tr>
<tr><td>0Kg≤平均體重變化≤-2Kg</td><td>15</td></tr>
<tr><td>+1Kg≤平均體重變化≤0Kg</td><td>10</td></tr>
<tr><td>+1Kg≤平均體重變化</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
</table>